




Будьте здоровы!

ООО ДЦ "Лабораторная диагностика-Асклепий"

Лицензия ЛО-25-01-003989 от 13.01.2017

Телефон (423) 202-3003

Адрес г. Владивосток, ул. Гамарника 3-б



ФИО:

Дата регистрации:		Направивший врач:					
День рождения:		ЛПУ:					
Пол:		Город:					
Место жительства:		Дата забора:					
Выдан:							
		Берем., недель:				№ заказа:	
№	Исследование	Маркер (параметр)	Результат	Мом	Локализация	Референсные значения	Дата иссл.
1	Антитела к SARS-CoV-2 Ig M	Антитела к SARS-CoV-2 Ig M	Не обнаружено		кровь (венозная)	КП <0,8 - Не обнаружено; КП <0,8 до <1,1 - "Серая зона" (результат неопределенный, требуется ретестирование через 3-4 дня с совместным определением SARS-CoV-2 IgG). Рекомендовано ПЦП исследования на момент получения сомнительного результата на IgM SARS-CoV-2; КП >=1,1 - Обнаружено (результат оценивается, как содержащий IgM к SARS-CoV-2). Рекомендовано ПЦП исследования на момент получения положительного результата на IgM и определение IgG. При наличии антител IgM пациент может быть заразным для окружающих	
2	Антитела к SARS-CoV-2 Ig G (весь пул иммуноглобулинов класса G, синтезированных ко всем антигенным детерминантам белка S, включая RBD-домен)	Антитела к SARS-CoV-2 Ig G, включая RBD-домен	Не обнаружено		кровь (венозная)	КП <0,8 - Не обнаружено; КП <0,8 до <1,1 - "Серая зона" (результат неопределенный, требуется ретестирование через 3-4 дня); КП >=1,1 - Обнаружено (результат оценивается, как содержащий IgG к SARS-CoV-2, перенесенная инфекция)	
Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.							

Уважаемый пациент!

Вы получили результат теста на антитела к COVID-19

Обращаем Ваше внимание, что он не является диагнозом и требует интерпретации лечащим врачом и может означать следующее:

IgM IgG

- -

Отсутствие инфекции или инкубационный период. Если есть контакт с инфекцией в анамнезе, сдать ПЦП РНК (мазок из носа и глотки) в МЦ "Асклепий" и пересдать антитела класса М через 7-10 дней

+ -

Ранняя фаза инфекции (начало заболевания). Соблюдать режим самоизоляции, ожидать указаний от врача участковой поликлиники и органов эпиднадзора\*, сдать анализ на IgG через 7-10 дней (по назначению лечащего врача)

+ +

Активная фаза инфекции, текущая инфекция. Соблюдать режим самоизоляции, ожидать указаний от врача участковой поликлиники и органов эпиднадзора\*.

- +

Перенесенная в прошлом инфекция, наличие иммунитета. Мы за Вас рады!